

ml
800

Scala®

700

Soppmiddel

600

Mot soppjukdommer i eple, pære og jordbær på friland.



© = Registrert varemerke tilhørende BASF

Soppmiddel

Mot soppjukdommer i eple, pære og jordbær på friland.

Sammensetning:

Pyrimetanol.....400 g/l

Formulering: SC Suspensions konsentrat

ADVARSEL

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P391 Samle opp spill.

P405 Oppbevares innelåst.

Følg bruksanvisningen for å unngå farer for mennesker og miljøet.

Gidtig for insekter

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 5 meter.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Nødtilfelle: Giftinformasjonen tlf.: 22 59 13 00

BASF Vakt Telefon: +49 180 2273 112

Behandlingsfrist: Kjernefrukt 30 dager

Jordbær på friland 14 dager

Avgiftsklasse 3

Reg. nr. 2007.115.14

Batch Nr./Produksjonsdato: se forpakningen.

Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdatoen.

Tilvirker: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

Importør: BASF AS, Lilleakerveien 2C, Postboks 563, NO-1327 Lysaker, Tlf: 66 79 21 00



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon

Bruksområde

Scala er tillatt brukt i eple, pære og jordbær på friland.

Behandlingsfrist

Kjernefrukt må ikke behandles senere enn 30 dager før høsting.

Jordbær må ikke behandles senere enn 14 dager før høsting.

Virkeområde

Scala virker forebyggende mot gråskimmel og skurv. Mot skurv er det også en kurativ virkning ved behandling inntil 72 timer etter infeksjon.

Pyrimetanol (virksomt stoff) har kryssresistens med andre anilinopyrimidiner, slik som cypro-dinil. Man bør derfor veksle med preparater i andre middelgrupper.

For å begrense risikoen for utvikling av resistente soppstammer, bør Scala ikke brukes mer enn én gang i vekstsesongen i jordbær og maksimalt tre ganger i eple og pære. Scala virker best ved temperaturer på opp til 15 °C. Lang opptørkingstid kan gi fare for sviing. Ved slike forhold kan det også oppstå korkdannelse på pærer.

Virkemåte

Det virksomme stoffet (pyrimetanol) hemmer dannelsen av enzymer som soppene trenger for å kunne angripe plantevevet.

Bruksrettledning

Jordbær

Bruk 200 ml i minst 100 liter vann pr. 1000 meter enkeltråd eller pr. dekar. Sprøyt under blomstring.

Eple og pære

Bruk 75 ml til 100 liter vann i eple og 112 ml til 100 liter vann i pære. I tåkesprøyte økes konsentrasjonen i forhold til reduksjonen av væskemengden. Den beste brukstida er mellom stadiene grønn spiss og kronbladfall (avblomstring).

Blanding med andre midler

Scala kan blandes med Delan WG, Candid, Fastac 50 og etter erfaringer hittil, med vanlig brukte sopp- og insektmidler hvis det er sammenfallende bruksområder og behandlingstider. Bland helst ikke mer enn 2 preparater hvis ikke noe annet er anbefalt. Bland ikke Scala med gjødselstoffer eller fosetyl aluminium.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av f.eks nitrilgummi (0,4 mm) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.

Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring

Scala bør lagres frostfritt i uåpnet og uskadet originalemballasje, beskyttet mot direkte sollys og andre varmekilder ved minimum 5 °C. Holdbarhet: Minimum 24 mdr. fra produksjonsdatoen.

Merk

Vi garanterer for produktets bestanddeler og kvalitet. Produsenten er ikke ansvarlig for virkningsskader inkludert som er oppstått på grunn av ikke anbefalt oppbevaring og/eller bruk av produktet.

ml
800

Scala®

700

Soppmiddel

600

Mot soppssjukdommer i eple, pære og jordbær på friland.



© = Registrert varemerke tilhørende BASF

Soppmiddel

Mot soppssjukdommer i eple, pære og jordbær på friland.

Sammensetning:

Pyrimetanil.....400 g/l

Formulering: SC Suspensions konsentrat

ADVARSEL

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp,

ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P391 Samle opp spill.

P405 Oppbevares innelåst.

Følg bruksanvisningen for å unngå farer for mennesker og miljøet.

Gidtig for insekter

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 5 meter.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Nødtilfelle: Giftinformasjonen tlf.: 22 59 13 00

BASF Vakt Telefon: +49 180 2273 112

Behandlingsfrist: Kjernefrukt 30 dager

Jordbær på friland 14 dager

Avgiftsklasse 3

Reg. nr. 2007.115.14

Batch Nr./Produksjonsdato: se forpakningen.

Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdatoen.

Tilvirker: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

Importør: BASF AS, Lilleakerveien 2C, Postboks 563, NO-1327 Lysaker, Tlf: 66 79 21 00

