


# Banker-System E

Kornbladlus (*Sitobion avenae*)

**Bruksformål:** Til oppformering av bladlus- snyltevepsen *Aphidius ervi* i et bankerplantesystem.

**Sammensetning:** Kornbladlus (*Sitobion avenae*) på byggkornplanter.

 HELSEKADELIG	<b>Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.</b> <b>Unngå innånding av støv.</b> <b>Unngå hudkontakt.</b>
---	---

**Tilvirker:** Biobest N.V., Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgia

**Importør:** NORGRO AS, Postboks 4144, 2307 Hamar

**Reg. Nr.:** 2008.84.09

**Nettoinnhold:** Byggkornplanter med ca. 500 kornbladlus

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.**  
**Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

**Bruksområde:**

Byggplanten med kornbladlus brukes til oppformering av snyltevepsen *Aphidius ervi* i prydplanter, grønnsaker og krydderurter i veksthus og plasttunell. Samt frukt- og bærvekster i veksthus og plasttunell.

**Virkeområde:**

Angrep av grønnflekket veksthusbladlus (*Aulacorthum solani*), potetbladlus (*Macrosiphum euphorbia*) og/ eller rosebladlus (*Macrosiphum rosae*) i veksthuskulturen vil kontrolleres på grunn av det konstante nærværet av *A. ervi* på kornplanter med kornbladlus.

**Virkemåte:**

Hunnsnyltevepsen parasitterer bladlus. Spising av bladlus kan også forekomme. Parasitterte bladlus svulmer opp og hardner til en læraktig grå-/ brunfarget mumie etter ca. 2 uker. Den ferdige snyltevepsen vil komme ut gjennom et hull bak på mumien.

**Utseende:**

Kornbladlus (*S. avenae*): voksne er gul- grønne/ rødbrune, 2-3 mm, med svarte ryggrør og lange antenner. Snylteveps (*A. ervi*): Svarte, 4-5 mm lange. Andre stadier av *A. ervi* utvikles inne i verten.

**Klimakrav:**

Bankerplantesystemet er effektivt opp til temperaturer rundt 30°C.



**Bruksrettledning:**

Pakken åpnes straks etter mottak. Ta ut bankerplanten og plasser den på en separat steinullmatte, eller plant den i ampler. Bankerplanten skal stå på et lyst sted i/ over plantekulturen i 1-2 måneder og må vannes jevnlig med vann/næring. Bruk en bankerplante pr. 2000 m<sup>2</sup>. *A. ervi* må kjøpes i tillegg. Disse leveres som voksne og/ eller mumier, som strøs ut på bankerplantene samtidig eller en uke etter utsett.

	Antall dyr/m <sup>2</sup>	Antall m <sup>2</sup> / 500 dyr	Intervall	Antall behandlinger
Banker-System E ( <i>S. avenae</i> )	0,25	2000	Annenhver uke	-
<i>Aphidius ervi</i>	0,15	3300	Hver uke	Minst 2 x

**Integrert plantevern:**

*S. avenae* er svært følsom for kjemiske plantevernmidler. Fjern bankerplanter med *S. avenae* i minst et døgn hvis kjemiske plantevernmidler skal brukes i kulturen. Sett bankerplanten et sted hvor den ikke påvirkes av sprøytemidlet. Bankerplanter med *S. avenae* bør ikke brukes sammen med bankerplanter med havrebladlus (*Rhopalosiphum padi*), eller samtidig med andre nytteorganismer som er naturlige predatorer på *S. avenae*.

**Lagring:**

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst.

**Forsiktighetsregler:**

Ingen.

**Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres

**Produksjonsdato (evt. batchnr.):**

Se forpakningen.

