

# Forbel 750

Fenpropimorf - emulsjonkonsentrat

5 L e

 **BASF**  
We create chemistry

## Sprøytemiddel mot sopp sykdommer i korn

**Sammensetning:**  
Fenpropimorf 750 g/l  
Klebe-, sprede-og oppløsningsmidler 210 g/l

### FARE

Irriterer huden.  
Gir alvorlig øyeskade.  
Farlig ved innånding.  
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  
Meget giftig for liv i vann.  
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN / en lege.  
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.  
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.  
Unngå innånding av aerosoler.  
Oppbevares innelåst.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



**BEHANDLINGSFRIST: Korn: 5 uker**  
**Avgiftsklasse 3**

**Tilvirker:**  
BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
Tyskland

**Importør:**  
BASF AS  
Lilleakerveien 2C  
Postboks 563  
NO-1327 Lysaker  
Tlf: 66 79 21 00

**Opplysninger i nødtilfelle:**  
Giftinformasjonen tlf.:  
22 59 13 00  
BASF Vakt tlf.:  
+49 180 2273 112

REG. NR. 2011.6.14

**Batchnr.: Se emballasjen.**  
**Produksjonsdato: Se emballasjen.**  
**Holdbarhet: Minimum 2 år.**



81092018 NO 1054



**Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.  
Det er forbudt å bruke Forbel 750 i strid med godkjent bruksområde, behandlingsfrist og å overskride den maksimalt tillatte dosering.**

#### **BRUKSOMRÅDE**

Forbel 750 er tillatt brukt mot sopp sykdommer i hvete, bygg, havre, rug og rughvete.

#### **VIRKEOMRÅDE**

Mjøldogg, brunrust, gulrust, kronrust, dvergrust, svartrust og grå øyeflekk.

#### **BEHANDLINGSFRIST**

Korn må ikke behandles senere enn 5 uker før høsting.

#### **VIRKNING**

Forbel 750 er et systemisk middel som tas raskt opp og transporteres oppover i plantene. Ny tilvekst etter sprøyting beskyttes derfor i en viss grad. Forbel 750 stopper utvikling av soppen raskt og hindrer videre spredning. Raskt optak og god virkning oppnås også ved lave temperaturer. Virkningen påvirkes lite av regn kort tid etter sprøyting. Langtidsvirkningen ved bruk av normaldose er 3 – 4 uker avhengig av tilveksthastighet og smittepress. For å forebygge utvikling av resistens hos sopporganismer bør Forbel 750 brukes i vekslning med andre soppmidler. Forbel 750 har god virkning mot mjøldogg og ulike rustsopper i alle kornslag. Preparatet har en viss virkning mot grå øyeflekk i bygg.

#### **Resistens**

For mange soppmidler er det alminnelig risiko for forekomst av sopptyper, som er motstandsdyktige (resistente) overfor det aktive stoffet. Under spesielt dårlige betingelser kan en endring i middelets virkning derfor ikke utelukkes. Da det generelt ikke er mulig å forutsi den konkrete risiko for resistensdannelse på grunn av de mange kultur- og anvendelsesbetingelser og påvirkningsmuligheter, fraskriver vi oss ansvaret for eventuelle skader som følge av resistensdannelse. Den anbefalte doseringen fra BASF skal ubetinget overholdes for å unngå virkningstap.

#### **BRUKSRETTLEDNING**

##### **Korn**

**Sprøytetid:** Sprøyting forebyggende eller ved begynnende angrep gir generelt best virkning, men god og hurtig kurativ virkning gjør at Forbel 750 også vil kontrollere allerede utbrudte soppangrep. Unngå å sprøyte i sol når det samtidig er høy lufttemperatur.

**Dosering:** Normaldose ved bruk av Forbel 750 alene er 100 ml/daa. Mot mjøldogg kan dosen senkes til 50 ml/daa ved forebyggende behandling. Virkningstiden er da kortere og gjentatt behandling kan bli nødvendig hvis det er vedvarende smittepress.

Mot gulrust, brunrust og grå øyeflekk brukes full dose når Forbel 750 brukes alene. I blanding med Tilt kan Forbel 750-dosen reduseres til 50 ml/daa. Bruk 20 – 40 l vann pr. daa.

#### **Tillaging av sprøytevæske:**

Forbel 750 kan blandes med aktuelle ugras-, sopp-, insekt- og stråforkortingsmidler.

Fyll først i halvparten av vannet, deretter tilsettes Forbel 750 og til slutt eventuelt andre preparater.

Bruk av endedyser frarådes.

#### **LAGRING**

Forbel 750 må lagres frostfritt. I uåpnet originalemballasje er preparatet holdbart i minst 2 år fra produksjonsdatoen.

#### **FORSIKTIGHETSREGLER**

Bruk vernehansker av (f.eks. av nitrilgummi), ansiktsskjerm, støvler og overtreksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtreksdress og helmaske med kombinasjonsfilter eller A1/P3 brukes.

Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

#### **RENGJØRING**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester i sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

#### **AVFALLSHÅNDTERING**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrest og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

#### **Merk**

Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets virkning, spesielt steds- eller regionsbetingede faktorer. Herunder hører for eksempel vær- og jordforhold, sorter, vekstskifte, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre produkter, forekomst av resistente organismer, sprøyteteknikk og så videre. Ved spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i produktets virkning eller at det kan oppstå skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.

# Forbel 750

Fenpropimorf - emulsjonkonsentrat

1 L e

 **BASF**  
We create chemistry

## Sprøytemiddel mot sopp sykdommer i korn

**Sammensetning:**  
Fenpropimorf 750 g/l  
Klebe-, sprede- og oppløsningsmidler 210 g/l

### FARE

Irriterer huden.  
Gir alvorlig øyeskade.  
Farlig ved innånding.  
Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  
Meget giftig for liv i vann.  
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONEN / en lege.  
VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.  
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.  
Unngå innånding av aerosoler.  
Oppbevares innelåst.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



**BEHANDLINGSFRIST: Korn: 5 uker**  
Avgiftsklasse 3

**Tilvirker:**  
BASF SE  
67056 Ludwigshafen  
Tyskland

**Importør:**  
BASF AS  
Lilleakerveien 2C  
Postboks 563  
NO-1327 Lysaker  
Tlf: 66 79 21 00

**Opplysninger i nødtilfelle:**  
Giftinformasjonen tlf.:  
22 59 13 00  
BASF Vakt tlf.:  
+49 180 2273 112

REG. NR. 2011.6.14

**Batchnr.: Se emballasjen.**  
**Produksjonsdato: Se emballasjen.**  
**Holdbarhet: Minimum 2 år.**

