

**MAJUScontrol**  
Rovtege (*Orius majusculus*)

**Bruksformål:**

Mot ulike trips-arter (f.eks. nelliktrips og amerikansk blomstertrips) i plantekulturer i veksthus, plasttunnel og i innendørsbeplantninger.

**Sammensetning:**

Inneholder nymfer og/eller voksne individer av arten *Orius majusculus* blandet med kli, vermikulitt og/eller sterilisert bokhvete.

**Tilvirker:** Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340 km. 419, La Mojonera, Almeria, Spania. 04745

**Importør:** Bombus Natur AS. Bjørkeveien 4B, 4345 Bryne, Norge

**Reg.nr:** 2018.23

**Netto innhold:** Se forpakning

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder.**

**Bruksområde:**

Bærvekster, frukt, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus og plasttunnel. I innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.).

**Virkeområde:**

Bekjemper ulike trips-arter f.eks. nelliktrips (*Thrips tabaci*) og amerikansk blomstertrips (*Frankliniella occidentalis*). Ved fravær av trips kan *O. majusculus* overleve på f.eks. sommerfugl-egg, midd, mellus, bladlus og pollen.

**Virkemåte:**

Både voksne individer og nymfer suger ut kroppsvæsken til byttedyret. Tripsen vil skrumpe inn og vil derfor være vanskelig å oppdage i kulturen.

**Utseende:**

Voksen rovtege: 2.6-3.0 mm, brunsvart med lysegule felter på antenner, bein og dekkvinger. De har også en lang sugesnabel som de legger inntil underkroppen når de ikke tar til seg næring.

Nymfer: Yngre nymfer er gule, eldre nymfer er mørkebrune med synlige vingeanlegg.

Egg: Vil ikke være synlig, legges i plantevev.

**Klimakrav:**

Optimale klimaforhold er 50- 80 % relativ fuktighet, 15- 25 °C og lang dag (over 16 timer).

**Bruksrettledning:**

Sett flasken horisontalt og roter forsiktig for å blande innholdet. Fordel innholdet i bokser eller i små hauger i kulturen, tidlig på morgenen eller sent på kveld.

Dosering:

	Antall dyr/ m <sup>2</sup>	Antall m <sup>2</sup> /500 dyr	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende	0,5	1000	Hver 14. dag	2x
Lett bekjempelse	1	500	Hver 14. dag	2x
Kraftig bekjempelse	10	100		1x

**Integrert plantevern:**

*O. majusculus* er følsom for de fleste kjemiske plantevernmidler. Bruk derfor preparater som er skånsomme mot nyttedyr (søk «side effect list»). *O. majusculus* kan med fordel suppleres med de fleste andre nytteorganismer mot trips og andre skadegjørere.

**Lagring:**

Oppbevar flaksen eller boksen horisontalt i mørke ved 10- 15 °C. Produktet bør ikke lagres lengre enn 48 timer. Det er anbefalt å slippe ut organismene samme dag eller dagen etter levering. De tåler ikke direkte sollys.

**Forsiktighetsregler:**

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

**Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdata (evt. Bachnr):** Se forpakning