

EPHEScontrol
Sommerfuglegg av voksmøll (*Ephestia kuehniella*)

Bruksformål:

Eggene er alternativ proteinkilde for rovtegene *Macrolophus pygmaeus* og *Orius majusculus* i plantekulturer i veksthus, plasttunnel og i innendørsbeplantninger.

Sammensetning:

Inneholder inaktive *Ephestia kuehniella* egg pakket i ris.
100 ml flaske 10 gram egg eller 30 gram egg.
Poser med 250 gram eller 500 gram egg.

Tilvirke: Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340 km. 419, La Mojonera, Almeria, Spania. 04745

Importør: Bombus Natur AS. Bjørekeveien 4B, 4345 Bryne, Norge

Reg.nr: 2018.30

Netto innhold: Se forpakning

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder.**

Bruksområde:

Frukt- og bærvekster, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus og plasttunnel. I innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.).

Virkeområde:

Ephestia kuehniella egg brukes til å føre og etablere rovteger *Macrolophus pygmaeus* og *Orius majusculus* i plantekulturen. Eggene er bestrålt eller frosset, og vil derfor aldri klekke. Rovtegepopulasjonen kan dermed holde seg stabil i perioder med lite skadedyr og være i beredskap i perioder med skadedyr.

Virkemåte:

Rovtegene spiser eggene når det er lite tilgang på byttedyr i kulturen.

Utseende:

Egg: 0.6 mm, gule og avlange.

Klimakrav:

Eggene tåler ikke direkte sollys, ellers ingen spesielle klimakrav.

Bruksrettledning:

Plasser eggene på de samme områdene nytteorganismene blir satt ut på. Vann bladene før utslipp slik at eggene fester seg på bladet.

	Antall egg / m ²	Antall m ² / 100 g	Intervall	Antall behandlinger
--	--------------------------------	-------------------------------	-----------	---------------------

Forebyggende	40 gram	2500	Annenhver uke	-
--------------	---------	------	---------------	---

Integrert plantevern:

E. kuehniella eggene er sterile (drept ved frysing eller stråling) og vil ikke påvirkes av kjemiske plantevernmidler. Men det kan oppstå problemer dersom nytteorganismene spiser egg med sprøytemiddelbelegg.

Lagring:

Oppbevar flaksen eller boksen horisontalt i mørke ved temperaturer mellom 8-10°C. Produktet bør ikke lagres lengre enn 5 dager. Det er anbefalt å slippe ut organismene samme dag eller dagen etter levering.

Forsiktighetsregler:

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Produksjonsdata (evt. Bachnr): Se forpakning