

**CHRYSOcontrol**  
Gulløylarve (*Chrysoperla carnea*)

**Bruksformål:**

Mot bladlus i plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.

**Sammensetning:**

Inneholder *Chrysoperla carnea* i larvestadiet.

**Tilvirker:** Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340 km. 419, La Mojonera, Almeria, Spania. 04745

**Importør:** Bombus Natur AS. Bjørkeveien 4B, 4345 Bryne, Norge

**Reg.nr:** 2018.36

**Netto innhold:** Se forpakning

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder.**

**Bruksområde:**

Bærvækster, frukt, grønnsaker, krydderurter og prydplanter i veksthus og plasttunnel, og i innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.).

**Virkeområde:**

Larvene til *C. carnea* bekjemper ulike bladlusarter. Larvene foretrekker bladlus, men kan også spise spinnmidd, mellus, ullus, trips og sommerfuglegg og -larver.

**Virkemåte:**

Larver av *C. carnea* suger ut innholdet av byttedyret. Voksne individer spiser kun pollen, nektar og honningdugg.

**Utseende:**

Voksne: 15-20 mm, grønne eller gule med gullglinsende øyne.

Larver: 1-8 mm, lysegule og rødbrune flekker.

Egg: 1 mm, lysegrønne og festet med lang stilk.

**Klimakrav:**

Optimale klimaforhold er 12-35°C, men de blir lite påvirket av klimatiske faktorer.

**Bruksrettledning:**

Åpne flasken og rist den forsiktig for å få fram larvene. Spre larvene utover i kulturen eller i angrepne områder. Dette bør gjøres tidlig på morgenen eller sent på kvelden.

	Antall dyr/ m <sup>2</sup>	Antall m <sup>2</sup> / 10 000 dyr	Intervall	Antall behandlinger
Lett bekjempelse	5 larver	2000	Hver uke	Til angrepet er under kontroll

Kraftig bekjempelse	40 larver	250	2 behandlinger på 8-10 dager	Til angrepet er under kontroll
---------------------	-----------	-----	---------------------------------------	-----------------------------------

**Integrert plantevern:**

*C. carnea* kan med fordel brukes sammen med snylteveps og/eller gallmygg mot bladlus. *C. carnea* kan være følsomme for flere plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som er skånsomme mot nyttedyr (se «side effect list»).

**Lagring:**

Oppbevar flaksen eller boksen horisontalt og ved temperaturer mellom 6-10 °C i mørke, med relativ luftfuktighet (RH) på > 85 %. Produktet bør ikke lagres lengre enn 48 timer. Det er anbefalt å slippe ut organismene samme dag eller dagen etter levering. De tåler ikke direkte sollys.

**Forsiktighetsregler:**

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

**Avfallshåndtering:**

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdata (evt. Bachnr):** Se forpakning