

Hypoline

Rovmidd (*Stratiolaelaps scimitus*)
(Tidligere kjent som *Hypoaspis miles*)

Bruksformål: Mot jordlevende stadier av mygg og fluer som f. eks. hærmygg, soppmygg og vannfluer, samt trips og spretthaler i plantekulturer i veksthus, plasttunnel, innendørs og ved matsopproduksjon.

Sammensetning: Egg, nymfer og voksne *Stratiolaelaps scimitus* i vermikulitt og torv tilsatt kopramidd (*Thyrophagus putrescentiae*).

**Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
Unngå innånding av støv.
Unngå hudkontakt.**

Tilvirker: Syngenta Bioline Agrosience Ltd. Telstar Nursery Holland Road,
Little Clacton Essex CO16 9QG. England

Importør: NORGRO AS. Postboks 4144, 2307 Hamar

Reg. nr.: 2018.75

Netto innhold: se forpakning

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

Bruksområde:

Stratiolaelaps scimitus kan brukes i alle plantekulturer i veksthus, plasttunneler og i innendørsbeplantning med organisk vekstmedium, samt ved produksjon av matsopp.

Virkeområde:

Stratiolaelaps scimitus bekjemper egg, larver og pupper av hærmygg (*Sciaridae spp.*), soppmygg, vannfluer og andre mygg og små fluer i vekstmediet. De foretrekker små larvestadier. Spiser også trips og spretthaler.

Virkemåte:

Voksne og nymfer søker aktivt etter jordboende insektstadier, og suger ut kroppsvæsken til byttedyret. *Stratiolaelaps scimitus* oppholder seg i og på vekstmediet rundt plantens stengel. Den vil sjelden bli observert på plantene.

Utseende:

Fullvoksne: Opptil 1 mm, lysbrune med 4 par bein
Larver og første nymfestadiet: Hvite med 3 par bein

Klimakrav:

Stratiolaelaps scimitus fungerer best i porøs, fuktig, men ikke for våt jord. Minimum temperatur bør være 15 °C.

Bruksrettleiding:

Preparatet ristes forsiktig før bruk, og innholdet fordeles i kulturen ved å strø innholdet jevnt ut, eller i små hauger (ca en spiseskje) på vekstmediet til plantene. *Stratiolaelaps scimitus* vil etablere og formere seg best hvis de legges i små hauger.

	Antall pr m ²	Ant. m ² pr 10 000 dyr	Ant. behandlinger
Forebyggende	100	100	1
Lett bekjempelse	200	50	1
Kraftig bekjempelse	200	20	1

Integreert plantevern:

Stratiolaelaps scimitus tåler kjemiske plantevernmidler bedre enn mange andre nytteorganismer, men det bør allikevel brukes kjemiske midler som er skånsomme mot nytteorganismer (se «side effect list»). *Stratiolaelaps scimitus* kan kombineres med *Steinernema feltiae* og de fleste andre nytteorganismer mot hærmygg og andre skadegjørere.

Lagring:

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres noen dager ved 15 – 20 °C i mørke. Sørg for ventilering slik at CO₂ som dannes slippes ut.

Forsiktighetsregler:

Bruk vernehansker, åndedretsvern med støvfilter (P2) og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Produksjonsdato (evt. batchnr.):

Se forpakning