

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av mindre betydning

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51
Centium 36 CS – Clomazon

Godkjent av Mattilsynet: 24.04.2020

Gyldig t.o.m: Godkjenningen av utvidelse av mindre betydninger er gyldig til godkjenningsperioden utløper. Centium 36 CS er godkjent til 31.10.2021.

Erklæring

Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets ordinære etikett.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor.

Advarsel

Alternativ 1:

Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett.

Følg anvisning på ordinær etikett angående resistenshåndtering.

Bruksområde

Åkerbønner, kålrot sådd eller plantet under dekke av fiberduk eller insektnett

Mot frøugras.

Antall behandlinger:

1 behandling

Behandlingsfrist:

Åkerbønner: Før spiring, før spiren når jordoverflaten (BBCH 07)

Kålrot sådd under fiberduk eller insektnett: etter såing, før oppspiring av kålrota.

Kålrot plantet under fiberduk eller insektnett: rett etter planting. Kålrotplantene skal ikke ha utviklet mer enn 5 varige blader ved behandling.

Bruksrettledning:

Dosering:

Åkerbønne: 12,5 ml/daa like etter såing.

Kålrot sådd under fiberduk eller insektnett: inntil 12,5 ml etter såing, før oppspiring av kålrota.

Kålrot plantet under fiberduk eller insektnett: inntil 12,5 ml rett etter planting. Kålrotplantene skal ikke ha utviklet mer enn 5 varige blader ved behandling.

Væskemengde

Centium 36 CS blandes i 20-40 l vann pr. daa

Påføring:

Centium 36 CS brukes som et jordherbicide og jordoverflaten bør da være fuktig ved påføringen. Behandling med åkersprøyte.