

Tilleggsetikett:

Utvidelse for bruksområde av mindre betydning

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51

Lentagran WP - pyridat

Godkjent av Mattilsynet: 18.04.2024

Gyldig t.o.m.: Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning (minor use) er gyldig til godkjenningsperioden for Lentagran WP utløper.

Erklæring

Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets ordinære etikett.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor.

Advarsel

Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett.

Bruksområde

Mot frøugras i kepaløk og sjalottløk.

Antall behandlinger:

Inntil 3 behandlinger

Behandlingsfrist:

21 dager

Bruksrettledning

| Kultur | Dose per dekar | Maks dose i alt per år | Sprøytetidspunkt | Merknader |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|
| Sådd kepaløk og sjalottløk | 10-50 g | 200 g | Fra spirende ugras til 21 dager før rykking | Splittbehandling er mulig, maksimum 3 behandlinger med 7-14 dagers intervall. Maks 50 g /daa ved siste behandling. Væskemengde 20-60 l/daa. |
| Satt kepaløk og sjalottløk | 25-75 g | 200 g | Fra spirende ugras til 21 dager før rykking | Splittbehandling er mulig, maksimum 3 behandlinger med 7-14 dagers intervall. Maks 50 g /daa ved siste behandling. Væskemengde 20-60 l/daa. |

Håndteringsfrist

Arbeidere som går inn i behandlet område og håndterer behandlede planter må bruke heldekkende arbeidstøy og hansker i en periode på 16 dager etter sprøyting. Dersom en går inn i behandlet område og håndterer behandlede plantedeler 16-53 dager etter sprøyting, må heldekkende arbeidstøy brukes. Dersom arbeidet kun omfatter generell inspeksjon og vanning av behandlet område, vil bruk av heldekkende arbeidstøy i en periode på 26 dager etter sprøyting være tilstrekkelig.