

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av mindre betydning

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51

Maxim 100 FS – fludioksonil

Godkjent av Mattilsynet: 29.03.2022

Gyldig t.o.m. : Godkjenningen av utvidelse av mindre betydning (minor use) er gyldig til godkjenningsperioden for Maxim 100 FS utløper

Erklæring

Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets ordinære etikett.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor.

Advarsel

I tillegg til advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett, gjelder følgende:

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier. Samle opp spill.

Bruksområde

Beising av setteløk (kepaløk) i utendørs beisebad.

Virkeområde

Mot fusarium (løkfusariose) og løkgråskimmel før setting.

Antall behandlinger:

1

Bruksrettledning

Dosering: 500 ml Maxim 100 FS pr. 100 l vann.

Behandlingstidspunkt

En gang fra 14 dager før setting til samme dag som setting.

Påføring

Setteløken dyppes i beisebadet i 15 min. Beisearbeidet utføres utendørs ved maskinell dypping av storekker i beisebad. Rest av beiseblandingen leveres til godkjent mottak.